

Klee

Art.-Nr.	Sorten	Eigenschaften	TKG g	Saatstärke kg/ha	Reihenabstand cm	Saat-tiefe cm	Zahl d. Nutz. pro Jahr	Ausdauer Jahre	Original-pack. kg
----------	--------	---------------	-------	------------------	------------------	---------------	------------------------	----------------	-------------------

Rotklee

Trifolium pratense

Die vielseitige Nutzbarkeit und der hohe Futterwert machen ihn zur bedeutendsten Futterpflanze als Reinsaat und zum wesentlichsten Bestandteil in kurzlebigen Kleegräsern auf den besseren, frischen Böden. Tetraploide Sorten sind ausdauernder und bringen eine höhere Grünmassenleistung. Dagegen ist Wiesenrotklee Wiro ausdauernder und entspricht der sogenannten „Mattenklee“-verwendung für Dauergrünland.

1045	Lucrum	Reife spät, diploid Bayer. Züchtung	1,8–2,3	18 – 25	15–20	1	3–4	überj.	25
1042	Titus	Reife früh–mittel, tetraploid Bayer.Züchtung	2,3–2,5	18 – 25	15–20	1	3–4	überj.	25
1685	Wiro	Reife sehr früh erste Sorte mit BSA-Zulassung	1,8–2,3	18 – 25	15–20	1	2	überj.	25

Luzerne

Medicago sativa

Die Königin der Futterpflanzen ist eine typische Ackerfutterpflanze, liebt trockene, kalkhaltige, nicht staunasse Standorte. Durch ihr großes Wurzelwerk überbrückt sie lange Trockenphasen. Um längere Zeit zu überdauern soll sie mindestens einmal im Jahr zum Blühen kommen und es darf nur verhalten mit Stickstoff gedüngt werden. Anbau: vorwiegend in Reinsaat, zunehmend aber auch in Kleegrasmischungen. Neu ist die Weideluzerne, die zunehmend als Beisat in Dauergrünland sowie auf Weiden zur Eiweißanreicherung verwendet wird. Sie ist trittunempfindlich und daher bestens geeignet.

	Sanditi	Reife mittel, neue Sorte	2–2,2	30 – 40	16–20	1	3–4	mehrj.	25
	Plato	Reife früh–mittel	2–2,2	30 – 40	16–20	1	3–4	mehrj.	25
	Franken Neu	Reife mittel, die Standardsorte	2–2,2	30 – 40	16–20	1	3–4	mehrj.	25
	Luzelle	Weideluzerne	2–2,2	30 – 40	16–20	1		mehrj.	25

Weißklee

Trifolium repens

Wichtige ausdauernde Kleeart für fast alle Böden. Er findet auch Verwendung in Wiesen, mehrjährigen Kleegrasmischungen und als Gründüngungspflanze in Untersaaten. Seine Eigenschaft ist es, oberirdische Kriechtriebe auszubilden, die sich stark verzweigen und schnell Lücken schließen.

2670	Haifa	Normal-Typ	0,5–0,8	10 – 12	15–20	1	4–5	mehrj.	25
1029	Rivendel	mittel hochwachsend	0,5–0,8	10 – 12	15–20	1	4–5	mehrj.	25
2671	Klondike	neu hochwachsend	0,5–0,8	10 – 12	15–20	1	4–5	mehrj.	25
1034	Mikonova	hochwachsend	0,5–0,8	10 – 12	15–20	1	4–5	mehrj.	25

Gelbklee

Medicago lupulina

Für Untersaaten zur Herbstnutzung bzw. zur Gründüngung – besonders für den Mähdrusch. Nachwuchs meist gering, Kalkreiche Böden sind von Vorteil.

1108	Virgo	EU-Sorte	1,8–2,3	22 – 28	15	1	2	mehrj.	25
------	--------------	----------	---------	---------	----	---	---	--------	----

Schwedenklee

Trifolium hybridum

Schnellwüchsig – vor allem im ersten Schnitt. Liebt Feuchtigkeit und gedeiht auch auf weniger kalkhaltigen Böden. Verwendung: Vorwiegend als Mischungspartner.

1093	Dawn	Kanadische Zuchtsorte	0,6–0,7	10	15–20	1	02. Mrz	mehrj.	25
------	-------------	-----------------------	---------	----	-------	---	---------	--------	----

Hornschotenklee

Lotus corniculatus

Wichtiger mehrjähriger Klee für Wiesen und Weiden. Widerstandsfähig bei Trockenheit, anspruchslos, braucht aber eine ausreichende Kalkversorgung.

1090	Oberhaunstädter	Bayerische Züchtung	1–1,3	15	15–20	1	2	mehrj.	25
------	------------------------	---------------------	-------	----	-------	---	---	--------	----

Alexandrinerklee

Trifolium alexadrinum

Schnellwüchsiger Sommerklee, so auch Ersatz für ausgefallene Futterschläge. Verträgt nur geringen Frost, braucht Wärme und Feuchtigkeit. Anbau: sowohl als Reinsaat als auch in Mischung mit Welschem oder Einjährigem Weidelgras. Alexandrinerklee eignet sich auch als Zwischenfrucht nach frühräumenden Früchten und zur Brache.

1069	Axi	mehrschnittig	2,7–3,2	20 – 25	20–25	1	3	einjährig	25
1066	Tabor	einschnittig	3,2	25	20–25	1	1	einjährig	25

Persischer Klee

Trifolium resupinatum

Bekannter Sommerklee mit schnellem Wachstumsvermögen auf leichten bis mittelschweren Böden. Persischer Klee wird vorwiegend als Mischungspartner im BSV-Sommerklee-Gras und zur Brache verwendet, oder im Zwischenfruchtanbau.

1085	Gorby	mehrschnittig sehr gute Nachwuchsleistung	1,2–1,4	20 – 20	15–20	1	3–4	einjährig	25
------	--------------	---	---------	---------	-------	---	-----	-----------	----

Art.-Nr.	Sorten	Eigenschaften	TKG g	Saat- stärke kg/ha	Reihen- abstand cm	Saat- tiefe cm	Zahl d. Nutz. pro Jahr	Aus- dauer Jahre	Original- pack. kg
----------	--------	---------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------

Inkarnatkle

Trifolium incarnatum

Einschnittige Kleeart, die überwiegend im Landsberger Gemenge verwendet wird. Ansaat im August, Nutzung im späten Frühjahr (Mai-Juni).

1120	Diogene	bewährte EU-Sorte	3-4	25-35	15-20	1-2	1	überj.	25
------	----------------	-------------------	-----	-------	-------	-----	---	--------	----

Seradella

Ornithopus sativus

Zwischenfruchtpflanze der kalkarmen Sandböden. Sie wird wegen ihrer langsamen Jugendentwicklung nur als Untersaat angebaut.

1100	Handelssaat	geprüfte Qualität	2,7-4,6	40	15-20	1-2	2	mehrj.	25
------	--------------------	-------------------	---------	----	-------	-----	---	--------	----

Bockharaklee

Melilotus officinalis/albus

(Stein- oder Honigklee) Pionierpflanze auf dürtigen Böden. Als Futterpflanze nicht geeignet (cumarinhaltig). Gute Bienenweide.

1105	Handelssaat	gelbblühend	3	25-30	15	1	2	mehrj.	25
1106	Handelssaat	weißblühend	3	25-30	15	1	2	mehrj.	25

Wundklee

Anthyllis vulneraria

Ein ausdauernder Klee der trockeneren und mageren Standorte. Als Reinsaat nicht zu empfehlen. Vom Hasen wird Wundklee sehr gern angenommen.

1101	Handelssaat	aus bayerischer Vermehrung	2,5-3	25-30	15-20	1		mehrj.	offen
------	--------------------	----------------------------	-------	-------	-------	---	--	--------	-------

Erdklee

Trifolium subteraneum

Auch „Bodenfrüchtiger Klee“ genannt, schnellwüchsiger Bodendecker zur Gründüngung und als Erosionsschutz (Weinbau). Aussaat bis Ende August.

2340	Denmark	bewährte Sorte	3	25	15	1	1	einjährig	25
------	----------------	----------------	---	----	----	---	---	-----------	----

Sumpfschotenklee

Lotus uliginosus

Ausdauernder Klee für feuchte bis nasse Lagen mit langen unterirdischen Ausläufern.

1102	Handelssaat	geprüfte Qualität	0,5-0,7	10	15-20	1	1	mehrj.	offen
------	--------------------	-------------------	---------	----	-------	---	---	--------	-------

Esparsette

Onobrychis stiva

Futterpflanze für leichte, trockene Sandböden mit gutem Kalkgehalt; verträgt noch mehr Trockenheit als Luzerne. Geringer Nachwuchs.

1107	Handelssaat	in Hülsen	21	150	15-20	2-3	2	mehrj.	25
------	--------------------	-----------	----	-----	-------	-----	---	--------	----

Bockshornklee

Trigonella foenum-graecum

Bockshornklee ist einjährig, übersteht keinen Winter (kommt aus dem Mittelmeerraum). Einzigartig ist sein Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen (z. B. ätherische Öle, Eiweiß und Gerbstoffe, sogenannte Saponine) und der intensive Geruch „Schabzieger-Aroma“, der von ihm ausgeht.

1104	Handelssaat	geprüfte Qualität	19	35	20	2-3	1	einjährig	25
------	--------------------	-------------------	----	----	----	-----	---	-----------	----



LandGreen Schaufläche
DLG Feldtag 2002.